

Algifor® Liquid caps 400

VERFORA SA

OOMed

Che cos'è Algifor Liquid caps 400 e quando si usa?

La capsula gelatinosa morbide Algifor Liquid caps 400 contiene il principio attivo ibuprofene. Questo possiede caratteristiche analgesiche, antipiretiche e antinfiammatorie. Algifor Liquid caps 400 è adatto per il trattamento a breve termine, ossia per una durata massima di 3 giorni consecutivi, per il trattamento di:

- dolori articolari ed ai legamenti,
- dolori dorsali,
- mal di testa,
- mal di denti,
- dolori mestruali,
- dolori a seguito di ferite,
- febbre in stati influenzali.

Quando non si può assumere Algifor Liquid caps 400?

- Se è allergico a una dei componenti o se ha manifestato dispnea o reazioni cutanee simili a un'allergia dopo aver assunto acido acetilsalicilico o altri medicinali contro i dolori o i reumatismi, i cosiddetti medicinali antiinfiammatori non steroidei.
- Nell'ultimo trimestre di gravidanza (consultare anche il capitolo «Si può assumere Algifor Liquid caps 400 durante la gravidanza o l'allattamento?»).
- In caso di ulcera gastrica e/o duodenale attiva o di emorragie gastrointestinali comparse ripetutamente in passato.
- In caso di emorragie o perforazioni gastrointestinali comparse in passato in associazione con una terapia a base di cosiddetti medicinali antinfiammatori non steroidei.
- In caso di malattie infiammatorie croniche dell'intestino (malattia di Crohn, colite ulcerosa).
- In caso di gravi limitazioni delle funzionalità epatiche o renali.
- In caso di insufficienza cardiaca grave.
- Per il trattamento dei dolori postoperatori dopo un'operazione di by-pass coronarico (o dopo l'uso di una macchina cuore-polmone).
- In caso di varicella.
- Nei bambini di età inferiore ai 12 anni. Non sono stati effettuati controlli sull'uso di Algifor Liquid caps 400 nei bambini di questa età.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Algifor Liquid caps 400?

- Durante il trattamento con Algifor Liquid caps 400 possono insorgere ulcerazioni delle mucose, raramente emorragie o in casi singoli perforazioni (perforazioni gastro-intestinali) nel tratto gastro-intestinale superiore. Durante il trattamento, queste complicazioni possono insorgere in ogni momento e anche senza sintomi di avvertimento. Per ridurre questi rischi dev'essere applicato il dosaggio efficace minimo per un trattamento il più breve possibile. Si rivolga al suo medico se accusa dolori allo stomaco che secondo lei potrebbero essere causati con l'assunzione del medicamento. I pazienti anziani possono reagire più sensibilmente al medicamento rispetto ai giovani adulti.
- È quindi particolarmente importante che i pazienti anziani comunichino immediatamente eventuali effetti collaterali al proprio medico.

Alla comparsa dei primi segni di mal di gola, febbre elevata, ferite superficiali nella bocca, disturbi similinfluenzali, intensa spossatezza, emorragie nasali e cutanee, il trattamento con ibuprofene deve essere immediatamente interrotto e occorre consultare il medico.

Molto raramente durante l'assunzione di Algifor Liquid caps 400 si può manifestare intenso mal di testa insieme a nausea, vomito e rigidità nucale. In questo caso il trattamento deve essere interrotto e occorre consultare il medico.

Nei casi seguenti deve prendere Algifor Liquid caps 400 solo su prescrizione e sotto sorveglianza del suo medico:

- se è sottoposto attualmente a terapie mediche a causa di una grave malattia;
- se in passato ha sofferto di ulcera gastrica o duodenale;
- se in passato ha subito un infarto cardiaco, un colpo apoplettico o una trombosi venosa o in caso di presenza di fattori di rischio (pressione arteriosa elevata, diabete, valori dei lipidi nel sangue elevati, fumo); per alcuni analgesici con azione simile, i cosiddetti inibitori della COX-2, in caso di dosaggi elevati e/o terapie a lungo termine, è stato notato un aumento del rischio per le malattie cardiache e i colpi apoplettici. Non si sa se questo aumento del rischio valga anche per Algifor Liquid caps 400;
- se soffre di una malattia del cuore o dei reni, se assume medicinali contro la pressione arteriosa elevata (p. es. medicinali diuretici, ACE-inibitori) o in caso di perdita elevata di liquidi, p. es. in caso di sudorazione elevata; l'assunzione di Algifor Liquid caps 400 può compromettere la funzione dei reni, e quindi aumentare la pressione arteriosa e/o l'accumulo di liquidi (edemi);
- se soffre di una malattia epatica;
- se è in cura con farmaci inibitori della coagulazione (fluidificanti del sangue, anticoagulanti) o ha disturbi della coagulazione;
- se soffre d'asma;
- se è in cura con antireumatici o altri analgesici (p. es. acido acetilsalicilico, Aspirina);
- se si assumono farmaci per il trattamento del diabete (eccetto insulina), per aumentare la secrezione di urina (farmaci diuretici), per il

trattamento d'infezioni (antibiotici al chinolone), contro l'AIDS (zidovudina), medicinali immunosoppressori (medicinali contro il rigetto dei trapianti (tacrolimus e ciclosporina)), corticosteroidi, antiaggreganti delle piastrine, inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) o farmaci contenenti una delle seguenti sostanze: litio, digossina, metotrexato, baclofene, fenitoina, probenecid o sulfonpirazone;

- se si è affetti da determinate malattie della pelle (lupus eritematoso sistemico (LES) o collagenosi miste), se si soffre di gravi reazioni cutanee quali la dermatite esfoliativa, la sindrome di Stevens-Johnson o la necrolisi epidermica tossica. Il picco del rischio di sviluppare reazioni di questo tipo sembra sussistere all'inizio della terapia, poiché queste reazioni, nella maggior parte dei casi, si manifestano nel primo mese di trattamento. Alla comparsa dei primi segni di eruzione cutanea, di lesioni delle mucose o di altri segni di reazione da ipersensibilità, l'assunzione di Algifor Liquid caps 400 va interrotta e occorre consultare immediatamente un medico;
- l'acido acetilsalicilico o altri antidolorifici non devono essere presi insieme all'ibuprofene, poiché aumenta il rischio di effetti collaterali.

Informi il suo medico se recentemente ha ricevuto un trattamento a causa di una interruzione di gravidanza.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, di allergie o assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!). Algifor Liquid caps 400 può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine.

Si può somministrare/usare Algifor Liquid caps 400 durante la gravidanza o l'allattamento?

Gravidanza

Se è attualmente incinta o se desidera una gravidanza, deve assumere Algifor Liquid caps 400 solo dopo averne parlato con il suo medico. Nell'ultimo trimestre di gravidanza Algifor Liquid caps 400 non deve essere assunto.

Allattamento

Algifor Liquid caps 400 non dovrebbe essere assunto durante l'allattamento, a meno che il suo medico non gliel'abbia esplicitamente permesso.

Come usare Algifor Liquid caps 400?

Adulti e ragazzi di più di 12 anni: 1 capsula gelatinosa morbida di Algifor Liquid caps 400 da assumersi con sufficiente liquido. La somministrazione può essere ripetuta soltanto dopo 4–6 ore.

Dose giornaliera massima: salvo diversa prescrizione medica, la dose massima è di 3 capsule gelatinose morbide di Algifor Liquid caps 400 in 24 ore.

In caso di dolori mestruali, si consiglia di cominciare la cura con 1 capsula gelatinosa morbida di Algifor Liquid caps 400 non appena si manifestano i primi dolori.

Utilizzate Algifor Liquid caps 400 solo per brevi periodi (mai per più di tre giorni) e solamente per trattare i disturbi sopracitati.

Se, malgrado aver preso, Algifor Liquid caps 400 i dolori aumentano, o se la zona dolente si arrossa o si gonfia, consultate il suo medico. Queste manifestazioni possono essere provocate da una malattia di natura grave.

Se i dolori non diminuiscono entro 3 giorni al massimo, dovete pure consultare il vostro medico, al fine di accertarne la causa.

Le capsule gelatinose morbide non sono destinate ad essere separate per la somministrazione di una mezza dose.

Bambini sotto di 12 anni: Algifor Liquid caps 400 non deve essere usato dai bambini d'età inferiore ai 12 anni. L'impiego e la sicurezza di Algifor Liquid caps 400 nei bambini sotto i 12 anni non sono stati finora studiati.

Le capsule di Algifor Liquid Caps non devono essere prese con delle bevande calde.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Algifor Liquid caps 400?

In seguito all'assunzione di Algifor Liquid caps 400 possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali, che possono richiedere anche un trattamento medico.

La preghiamo di informare subito il suo medico se, in lei, compaiono uno o più dei seguenti sintomi e di interrompere, in questo caso, il trattamento con Algifor Liquid caps 400:

- Spesso si verificano disturbi gastrointestinali quali stomaco pesante, bruciore di stomaco, dolori addominali, nausea, diarrea o stitichezza. Occasionalmente compare vomito. Raramente si verificano flatulenze. Algifor Liquid caps 400 può irritare la mucosa gastrica o duodenale. In casi molto rari si verificano ulcere gastriche o duodenali seguite da emorragie gastriche o duodenali, talora con esito letale.
- Occasionalmente possono comparire reazioni da ipersensibilità della pelle o delle mucose, in particolare nei pazienti affetti da asma o da ipersensibilità verso altri medicinali antinfiammatori, antidolorifici o antipiretici. Molto raramente possono manifestarsi gravi reazioni cutanee con arrossamento e formazione di bolle. Molto raramente possono verificarsi gravi reazioni da ipersensibilità quali gonfiore della lingua o della laringe, calo della pressione arteriosa e shock circolatorio.
- Spesso compare mal di testa, occasionalmente compaiono vertigini e molto raramente disturbi della vista, ronzio auricolare e riduzione dell'udito, come anche depressione e sensazione di ansia.
- Occasionalmente si possono manifestare malattie dei reni. Dolori ai fianchi o addominali, sangue nelle urine e febbre possono essere sintomi di un danno renale. Algifor Liquid caps 400 può causare una ritenzione accentuata di acqua nei tessuti (edemi), in particolare nei pazienti affetti da ipertensione arteriosa o funzione renale ridotta, cosa che, in caso di ristagno nei polmoni, può portare ad affanno.

- In relazione all'assunzione di Algifor Liquid caps 400 sono stati riportati occasionalmente stanchezza e molto raramente stati confusionali.
- Occasionalmente si può verificare una carenza di ferro,
- Molto raramente compaiono disfunzione epatica e danni epatici.
- I medicinali del tipo di Algifor Liquid caps 400 sono correlati con un rischio minimamente aumentato di attacchi di cuore («infarto miocardico») o di colpi apoplettici.

Se osserva effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini!

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di documentazione professionale, possono darle ulteriori informazioni.

Che cosa contiene Algifor Liquid caps 400?

1 capsula gelatinosa morbida contiene 400 mg di ibuprofene e eccipienti.

Numero dell'omologazione

65372 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Algifor Liquid caps 400? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza ricetta medica. Scatole da 10 capsule gelatinose morbide.

Titolare dell'omologazione

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2017 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

26615 / 17.10.2018