

Arbid® N

VERFORA SA

Che cos'è Arbid N e quando si usa?

Arbid N contiene il principio attivo clorfenamina maleato (un antistaminico) e viene utilizzato nelle malattie infiammatorie ed allergiche delle vie respiratorie superiori quali il raffreddore, il raffreddore da fieno, la rinite cronica, la rinite vasomotoria o allergica, la rinofaringite, la sinusite allergica nonché come adiuvante in caso di influenza e nelle malattie da raffreddamento. Per il trattamento sintomatico di malattie allergiche quali l'orticaria e la congiuntivite.

Quando non si può assumere Arbid N?

Non deve assumere il medicamento, se è ipersensibile ad un componente del medicamento, se vi è il rischio di glaucoma ad angolo stretto (aumento della pressione intraoculare) e se ha difficoltà ad urinare, oppure in caso di terapia con determinati antidepressivi (in particolare inibitori della MAO) e nelle 2 settimane successive al termine di tale trattamento. Oltre a ciò, Arbid N non deve essere assunto durante l'ultimo trimestre di gravidanza o durante l'allattamento (vedere il capitolo «Si può assumere Arbid N durante la gravidanza o l'allattamento?»).

Arbid N non deve essere usato nei bambini di età inferiore a 3 anni.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Arbid N?

Arbid N non deve essere assunto per periodi più prolungati o in dosi superiori a quelle raccomandate senza aver prima consultato il medico.

Se si manifestano reazioni allergiche o un cosiddetto broncospasmo (restringimento dei bronchi con conseguenti difficoltà respiratorie; vedere il capitolo «Quali effetti collaterali può avere Arbid N?»), si deve interrompere immediatamente il trattamento e informare il medico.

Questo medicamento può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, se soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere Arbid N durante la gravidanza o l'allattamento?

Se ha programmato una gravidanza, se è in gravidanza o se sta allattando, dovrebbe rinunciare all'assunzione di medicinali. È noto che l'assunzione di Arbid N durante l'ultimo trimestre di gravidanza può compromettere la salute del feto. Per questo motivo Arbid N non deve essere assunto nell'ultimo trimestre di gravidanza. Durante il primo e il secondo trimestre di gravidanza Arbid N può essere assunto solo se strettamente necessario e dietro prescrizione medica.

Arbid N non deve essere assunto durante l'allattamento. Se, nonostante ciò, deve assolutamente assumere Arbid N su prescrizione medica, deve anche rinunciare all'allattamento.

Come usare Arbid N?

Salvo diversa prescrizione medica, la posologia abituale per i bambini di 3 – 5 anni è di 10 gocce 4 – 6 volte al giorno; per bambini di 6 – 12 anni: 20 gocce 4 – 6 volte al giorno; per adulti: 40 gocce 4 – 6 volte al giorno.

Assumere il medicamento preferibilmente al di fuori dei pasti.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Arbid N?

Con l'assunzione di Arbid N possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali.

Frequenti: sonnolenza e riduzione della prontezza dei riflessi (vedere il capitolo «Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Arbid N?»).

Occasionali: disturbi gastrointestinali quali stitichezza; inoltre, secchezza della bocca, disturbi della minzione, disturbi visivi (disturbi dell'accomodazione), aumento della pressione intraoculare, irrequietezza (soprattutto nei bambini), nervosismo e disturbi del sonno.

Nelle persone sensibili si possono manifestare reazioni allergiche (eruzioni cutanee, prurito, accelerazione del polso, disturbi della respirazione, perdita di coscienza). In questo caso deve interrompere l'assunzione del medicamento e rivolgersi il più presto possibile al suo medico.

In caso di sovradosaggio del principio attivo clorfenamina maleato possono insorgere crampi e disturbi respiratori fino all'insufficienza respiratoria acuta e al coma. I bambini (soprattutto i bambini piccoli) reagiscono con particolare sensibilità ai dosaggi troppo elevati.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

I flaconi di Arbid N sono provvisti di una chiusura a prova di bambino. Per aprire il flacone si deve spingere verso il basso e contemporaneamente ruotare il tappo di chiusura. La chiusura a prova di bambino è efficace solo quando dopo l'uso si stringe il tappo con forza fino in fondo.

Conservare Arbid N a temperatura ambiente (15–25 °C) nella confezione originale e fuori dalla portata dei bambini.

Chiudere di nuovo il flacone accuratamente dopo la presa di una dose.

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Arbid N?

1 g (circa 20 gocce) contiene: 2 mg di clorfenamina maleato; conservanti: sale sodico del metile paraidrossibenzoato (E 219), sale sodico del propile paraidrossibenzoato (E 217); aromatizzanti e altre sostanze ausiliarie.

Numero dell'omologazione

58373 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Arbid N? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria, senza prescrizione medica, in flaconi da 30 ml.

Titolare dell'omologazione

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2010 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

22209 / 06.06.2019