

# Lidazon® Actilong

VERFORA SA

## OEMéd

### **Qu'est-ce que Lidazon Actilong et quand est-il utilisé?**

Lidazon Actilong se présente sous forme de comprimés à sucer exempts de sucre contenant une association de cétylpyridinium, qui possède des effets antibactériens, et de lidocaïne, qui soulage les douleurs. On l'utilise lors d'inflammations de la sphère bucco-pharyngienne, surtout en cas de maux de gorge, d'enrouement et d'aphtes ainsi qu'à titre de médicament d'appoint dans le traitement de l'angine.

*La formulation particulière de Lidazon Actilong prolonge la persistance de son action sur la muqueuse.*

Un arôme menthe confère un goût agréable aux comprimés à sucer Lidazon Actilong.

### **De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?**

*Indication pour diabétiques:* Les comprimés à sucer peuvent être utilisés par les diabétiques. 1 comprimé à sucer correspond à environ 0,06 équivalent farineux (26 kJ ou 6 kcal).

Les comprimés à sucer Lidazon Actilong ne contiennent pas de sucre cariogène et ménagent les dents.

### **Quand Lidazon Actilong ne doit-il pas être utilisé?**

Ne pas utiliser Lidazon Actilong en cas d'hypersensibilité connue envers l'un des constituants.

### **Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Lidazon Actilong?**

En cas de plaies hémorragiques de la cavité buccale ou pharyngée, utiliser les comprimés à sucer avec prudence, pour autant que ce soit nécessaire. Veuillez consulter un médecin en cas de fièvre élevée ou si aucune amélioration n'est visible après une semaine.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

### **Lidazon Actilong peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?**

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

### **Comment utiliser Lidazon Actilong?**

Sauf autre prescription du médecin:

*Adultes et enfants dès 6 ans:* Laisser fondre lentement un comprimé à sucer dans la bouche toutes les 3 à 4 heures.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

### **Quels effets secondaires Lidazon Actilong peut-il provoquer?**

L'utilisation de Lidazon Actilong peut provoquer les effets secondaires suivants:

Une utilisation excessive ou prolongée de Lidazon Actilong peut entraîner des réactions locales d'irritation. En cas de plaie récente de la bouche, un risque d'hémorragie existe.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

### **A quoi faut-il encore faire attention?**

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur l'emballage.

Conserver à température ambiante (15–25 °C). Conserver hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

### **Que contient Lidazon Actilong?**

1 comprimé à sucer contient: *Principes actifs:* 1,25 mg de chlorure de cétylpyridinium et 1,00 mg de chlorhydrate de lidocaïne.

*Excipients:* arômes, sorbitol, autres excipients.

### **Numéro d'autorisation**

57891 (Swissmedic).

***Où obtenez-vous Lidazon Actilong? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?***

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale. Emballages de 24 comprimés à sucer.

***Titulaire de l'autorisation***

VERFORA SA, Villars-sur-Glâne.

**Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en janvier 2009 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).**

21465 / 15.10.2018