

# Lidazon® Actilong

VERFORA SA

## 00Med

### **Che cos'è Lidazon Actilong e quando si usa?**

Lidazon Actilong si presenta sotto forma di compresse orosolubili senza zucchero, contenenti cetilpiridinio, ad azione antibatterica, e lidocaina, ad azione analgesica. Il preparato viene utilizzato per le infiammazioni del cavo orofaringeo, soprattutto in caso di mal di gola, raucedine ed afte, nonché come coadiuvante nel trattamento dell'angina.

*La speciale formulazione di Lidazon Actilong ne prolunga la durata di azione sulla mucosa.*

L'aroma mentolato dà alle compresse di Lidazon Actilong un piacevole gusto.

### **Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?**

*Indicazioni per i diabetici:* le compresse orosolubili possono essere consumate dai diabetici. 1 pastiglia corrisponde all'incirca a 0,06 equivalenti pane (26 kJ o 6 kcal).

Le compresse orosolubili Lidazon Actilong non contengono zuccheri cariogeni e non danneggiano i denti.

### **Quando non si può assumere Lidazon Actilong?**

Non utilizzare *Lidazon Actilong* in caso di ipersensibilità nota ad uno dei componenti.

### **Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Lidazon Actilong?**

In caso di ferite sanguinanti nel cavo orale o faringeo, prendere le compresse con cautela, e solo se non se ne può fare a meno. Consultare un medico in caso di febbre alta o se non si manifesta alcun miglioramento entro una settimana.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui:

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

### **Si può usare Lidazon Actilong durante la gravidanza o l'allattamento?**

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono mai state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

### **Come usare Lidazon Actilong?**

Salvo diversa prescrizione medica: *Adulti e bambini a partire dai 6 anni.* lasciar sciogliere lentamente in bocca una compressa ogni 3 - 4 ore.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

### **Quali effetti collaterali può avere Lidazon Actilong?**

L'uso di Lidazon Actilong può provocare i seguenti effetti collaterali:

Un uso eccessivo o prolungato di Lidazon Actilong può causare reazioni irritative locali. In caso di ferita recente nel cavo orale sussiste un rischio di emorragia.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

### **Di che altro occorre tener conto?**

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori della portata dei bambini.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

### **Cosa contiene Lidazon Actilong?**

*1 compressa orosolubile* contiene: *Principi attivi:* 1,25 mg di cloruro di cetilpiridinio e 1,00 mg di cloridrato di lidocaina.

*Sostanze ausiliarie:* aromi, sorbitolo, altre sostanze ausiliarie.

### **Numero dell'omologazione**

57891 (Swissmedic).

### **Dov'è ottenibile Lidazon Actilong? Quali confezioni sono disponibili?**

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica. Confezioni da 24 compresse orosolubili.

### **Titolare dell'omologazione**

VERFORA SA, Villars-sur-Glâne.

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2009 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

21465 / 15.10.2018