

Lidazon® Chlorhexidina e lidocaina spray

VERFORA SA

OOMed

Che cos'è Lidazon Chlorhexidina e lidocaina spray e quando si usa?

Lidazon Chlorhexidina e lidocaina spray contiene i principi attivi lidocaina e clorexidina digluconato.

Lidazon Chlorhexidina e lidocaina spray può essere utilizzato per la disinfezione locale e per l'attenuazione dei sintomi in caso di faringiti e laringiti dolorose.

Quando non si può usare Lidazon Chlorhexidina e lidocaina spray?

Lidazon Chlorhexidina e lidocaina spray non deve essere utilizzato in caso di ipersensibilità nota a uno qualsiasi dei componenti.

I pazienti con ipersensibilità agli anestetici locali non devono utilizzare Lidazon Chlorhexidina e lidocaina spray.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Lidazon Chlorhexidina e lidocaina spray?

Lidazon Chlorhexidina e lidocaina spray contiene clorexidina. La clorexidina può causare reazioni di ipersensibilità acute (reazioni anafilattiche) della cute e delle mucose, che si manifestano con arrossamento cutaneo, orticaria, prurito, gonfiore della cute o delle mucose e, in casi gravi, con nausea, coliche, asma, gonfiore delle vie respiratorie superiori, caduta della pressione arteriosa o shock circolatorio. Se dovessero manifestarsi questi sintomi, deve interrompere l'utilizzo di Lidazon Chlorhexidina e lidocaina spray e rivolgersi al medico. In caso di pazienti con rispettiva sensibilizzazione, l'impiego di clorexidina, soprattutto nell'ambito di interventi chirurgici, può causare fenomeni di anafilassi. Dal punto di vista allergologico la clorexidina è quindi da considerare problematica. Se durante l'utilizzo di Lidazon Chlorhexidina e lidocaina spray si manifestano sintomi che fanno sospettare un'allergia, si devono evitare i prodotti contenenti clorexidina (anche i cosmetici). Per escludere l'eventuale presenza di ipersensibilità, si può praticare un esame allergologico.

Lo spray non deve essere utilizzato in presenza di ferite sanguinanti nella cavità orofaringea.

In caso di febbre elevata o se dopo una settimana non si osserva alcun miglioramento, si deve consultare un medico.

Il medicamento non deve essere deglutito. Dopo utilizzo in bocca, i residui di liquido devono essere sputati.

Va evitato qualsiasi contatto con gli occhi.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffra di altre malattie, soffra di allergie o assuma o applichi esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può utilizzare Lidazon Chlorhexidina e lidocaina spray durante la gravidanza o l'allattamento?

Lidazon Chlorhexidina e lidocaina spray non deve essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento, salvo che l'impiego non avvenga su prescrizione medica.

Come usare Lidazon Chlorhexidina e lidocaina spray?

Adulti e adolescenti da 12 anni di età: da 3 a 5 spruzzi per applicazione, 6-10 applicazioni al giorno.

A causa dell'effetto analgesico del medicamento viene sconsigliato l'utilizzo immediatamente prima dei pasti.

L'uso e la sicurezza nei bambini finora non sono stati esaminati.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Lidazon Chlorhexidina e lidocaina spray?

Si possono manifestare reazioni di ipersensibilità acute, soprattutto a carico della cute e delle mucose (vedi «Quando è richiesta prudenza nell'uso di Lidazon Chlorhexidina e lidocaina spray?»).

Occasionalmente sono state osservate irritazioni locali. Si possono manifestare disturbi del gusto e una sensazione di bruciore in bocca.

In caso di utilizzo regolare si può osservare una colorazione giallastra o brunastra dei denti, che può essere rimossa mediante pulizia intensiva dei denti.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Lidazon Chlorhexidina e lidocaina spray?

1 spruzzo di soluzione di Lidazon Chlorhexidina e lidocaina spray contiene:

Principi attivi: clorexidina digluconato 180 µg; lidocaina cloridrato 45 µg.

Sostanze ausiliarie: sostanze aromatiche, saccarina sodica e altre sostanze ausiliarie. Contiene il 44,4% v/v di alcol.

Numero dell'omologazione

66523 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Lidazon Chlorhexidina e lidocaina spray? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica. Lidazon Chlorhexidina e lidocaina spray: flacone spray con 30 ml di soluzione.

Titolare dell'omologazione

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2017 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

28018 / 15.10.2018