

Lidazon® liquide

VERFORA SA

OEMéd

Qu'est-ce que Lidazon liquide et quand est-il utilisé?

Lidazon liquide est une solution prête à l'emploi, exempte de sucres, pour le traitement des infections de la bouche, du pharynx et de la gorge. Bien toléré par les muqueuses, Lidazon liquide calme la douleur, combat les maux de gorge, la dysphagie, l'enrouement. Son contenu antiseptique combat les agents pathogènes des inflammations.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

L'inflammation de la gorge peut être le signe d'une angine sévère ou d'une maladie générale nécessitant une consultation médicale. Il faut y penser surtout si la fièvre est élevée, si les ganglions du cou sont douloureux et si les symptômes persistent ou récidivent.

Quand Lidazon liquide ne doit-il pas être utilisé?

Les patients hypersensibles aux colorants azoïques, à l'acide acétylsalicylique, ainsi qu'aux antirhumatismaux et aux analgésiques (inhibiteurs de la synthèse des prostaglandines), ne doivent pas utiliser Lidazon liquide.

De même on évitera son utilisation dans les cas d'hypersensibilité connue à l'un de ses constituants.

L'utilisation et la sécurité d'emploi de Lidazon liquide n'ont pas été étudiées chez l'enfant et l'adolescent.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Lidazon liquide?

En cas de fièvre élevée ou si dans un délai d'une semaine aucune amélioration n'est apparue, veuillez consulter un médecin.

Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Lidazon liquide peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Cette préparation contient de l'alcool (12% vol.).

Par mesure de précaution, vous devriez renoncer à prendre Lidazon liquide durant la grossesse et l'allaitement.

Au cours de la grossesse et de la période d'allaitement, il y a lieu de n'utiliser Lidazon liquide que suivant l'ordonnance explicite et sous le contrôle de votre médecin.

Comment utiliser Lidazon liquide?

Lidazon liquide est utilisé pur et non dilué.

Adultes: Se rincer la bouche pendant 15 à 30 secondes, puis se gargariser avec une cuillerée à soupe de Lidazon liquide pur, 2 à 4 fois par jour. Les inflammations locales de la cavité buccale seront tamponnées plusieurs fois par jour avec un tampon d'ouate imbibé de Lidazon liquide.

L'utilisation et la sécurité d'emploi de Lidazon liquide n'ont pas été étudiées chez l'enfant et l'adolescent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Lidazon liquide peut-il provoquer?

L'utilisation de Lidazon liquide peut provoquer les effets secondaires suivants:

Troubles généraux et anomalies au site d'administration: des réactions d'hypersensibilité (allergie) au niveau des organes cutanés et des organes respiratoires, en particulier chez les patients souffrant d'asthme, d'urticaire (chronique) ou d'hypersensibilité à l'acide acétylsalicylique ou à d'autres antirhumatismaux et analgésiques.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Conserver Lidazon liquide à température ambiante (15–25 °C) et hors de la portée des enfants.

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Lidazon liquide contient 12% vol. d'alcool.

Que contient Lidazon liquide?

100 ml contiennent:

Principes actifs: 40 mg de chlorure de cétalpyridinium, 20 mg d'alcool 2,4-dichlorobenzyle, 6,6 mg de chlorhydrate de lidocaïne.

Excipients: propylène glycol, saccharine, substances aromatiques, colorant: amarante (E123). Contient 12% vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation

44036 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Lidazon liquide? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale. En emballage de 240 ml.

Titulaire de l'autorisation

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2014 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

21467 / 24.10.2018