

Merfen solution aqueuse

VERFORA SA

OEMéd

Qu'est-ce que Merfen solution aqueuse et quand doit-il être utilisé?

Merfen solution aqueuse est un désinfectant avec les substances actives du digluconate de chlorhexidine et du chlorure de benzoxonium. Il agit sur les micro-organismes responsables d'une infection. Merfen solution aqueuse reste actif en présence de sang et de pus. L'application de Merfen solution aqueuse est indolore. La préparation est indiquée pour désinfecter des plaies et des blessures, telles que égratignures, écorchures, coupures, brûlures légères (du 1er degré superficiel, et/ou de faible étendue) ainsi que les piqûres d'insectes.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Les plaies de grande surface, très souillées ou profondes, telles que les plaies dues à une morsure ou à une pointe, nécessitent un traitement médical (entre autre risque de tétanos). Dans les cas où le périmètre de la blessure ne diminue pas au bout d'un certain temps, ou si la plaie ne se cicatrise pas dans le délai de 10 à 14 jours, veuillez également consulter un médecin. Faites de même si les bords de la plaie sont très rouges, si celle-ci enfle subitement, devient très douloureuse, ou encore si la blessure est accompagnée de fièvre (risque d'empoisonnement du sang).

Quand Merfen solution aqueuse ne doit-il pas être utilisé?

Vous ne devez pas utiliser Merfen solution aqueuse si vous souffrez d'allergie au digluconate de chlorhexidine, au chlorure de benzoxonium, aux ammoniums quaternaires ou à l'un des excipients de cette préparation.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Merfen solution aqueuse?

Merfen est uniquement destiné à un usage externe. Evitez de mettre Merfen en contact avec les yeux, les oreilles (conduit auditif) et les muqueuses (comme celles de la bouche ou du nez). En cas de contact de Merfen avec les yeux, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau. Merfen ne doit pas être avalé. Merfen ne doit pas être utilisé trop souvent ou pendant une longue période sans l'avis du médecin. Si vous constatez une irritation cutanée ou une sensibilité anormale, vous ne devriez plus utiliser Merfen solution aqueuse.

Pour les enfants de moins de 2 ans, Merfen solution aqueuse ne doit être utilisé que sur prescription médicale. La prudence est de rigueur avec les nouveau-nés et en particulier, les prématurés. Merfen solution aqueuse peut déclencher des brûlures chimiques de la peau. Après la désinfection, laisser sécher la peau avant d'appliquer un pansement léger. Afin de prévenir les irritations cutanées, Merfen solution aqueuse ne doit pas être appliqué sous un pansement étanche. Aucune interaction avec d'autres médicaments n'est attendue en raison du faible taux de résorption des principes actifs, le digluconate de chlorhexidine et le chlorure de benzoxonium. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Veuillez consulter votre médecin si vous devez traiter des blessures étendues ou des brûlures.

Merfen solution aqueuse peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Grossesse:

La préparation peut être utilisée en petites quantités (sur des petites plaies) pendant la grossesse. Il n'existe pas de données appropriées concernant l'utilisation du digluconate de chlorhexidine et du chlorure de benzoxonium chez la femme enceinte. Le risque potentiel chez l'humain est inconnu; on suppose toutefois qu'il est très faible, car le digluconate de chlorhexidine et le chlorure de benzoxonium ne sont que très faiblement résorbés après une application topique. Demandez conseil à votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous désirez utiliser la préparation pendant la grossesse, particulièrement au cours des trois premiers mois.

Allaitement:

On ne sait pas si le digluconate de chlorhexidine et le chlorure de benzoxonium sont excrétés dans le lait maternel. Merfen solution aqueuse peut être utilisé en petites quantités (sur des petites plaies) pendant l'allaitement, sauf sur les seins. Avant d'allaiter, vous devriez soigneusement laver vos mamelons à l'eau par mesure de précaution générale.

Comment utiliser Merfen solution aqueuse?

Utilisez ce médicament comme décrit plus bas ou comme indiqué par votre pharmacien ou droguiste. Merfen solution aqueuse est uniquement destiné à une utilisation sur la peau.

Adultes et enfants dès 2 ans:

Merfen solution aqueuse:

Appliquer la solution 1-2 fois par jour directement sur la peau et les blessures, ou à l'aide d'une compresse. Veiller à ce que Merfen solution aqueuse ne s'accumule pas sous les plis de la peau. Après la désinfection, laisser sécher la peau avant d'appliquer un pansement léger. Ne pas utiliser Merfen solution aqueuse sous un pansement étanche. En cas de piqûres d'insectes: mettre quelques gouttes de Merfen solution aqueuse sur l'endroit piqué, laisser sécher.

Merfen solution aqueuse, spray:

Avant la première utilisation, pomper plusieurs fois jusqu'à obtenir les nébulisations. Appliquer 1-2 nébulisations directement sur les parties à traiter. Le flacon contient uniquement de la solution aqueuse Merfen (sans gaz propulseur) donc il peut être utilisé dans n'importe quelle position, même s'il est dirigé vers le bas. Dans ce cas, quelques mouvements de pompe sont nécessaires afin d'obtenir la première nébulisation. Veiller à ce que Merfen solution aqueuse ne s'accumule pas sous les plis de la peau. Après la désinfection, laisser sécher la peau avant d'appliquer un pansement léger. Ne pas utiliser Merfen solution aqueuse sous un pansement étanche. Pour les enfants de moins de 2 ans, la préparation ne doit être utilisée que sur prescription médicale. Contactez votre médecin si vous avez utilisé plus de Merfen solution aqueuse que vous n'auriez dû ou si vous avez accidentellement avalé Merfen solution aqueuse. Veuillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Merfen solution aqueuse peut-il provoquer?

Comme tous les médicaments, Merfen solution aqueuse peut provoquer des effets secondaires, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tous les utilisateurs.

Certains effets secondaires sont *très rares* (apparaissent chez moins de 1 patient sur 10'000), *mais peuvent être graves*: difficultés respiratoires, vertiges (réaction anaphylactique), gonflement du visage et de la gorge (angio-oedème). Si vous remarquez un des symptômes mentionnés ci-dessus (qui peuvent être le signe d'une réaction allergique), arrêtez l'utilisation de Merfen solution aqueuse et demandez immédiatement un conseil médical.

Les effets secondaires suivants sont *rare*s (apparaissent chez 1 à 10 patients sur 10'000): irritations de la peau.

Les effets secondaires suivants sont *très rares* (apparaissent chez moins de 1 patient sur 10'000): urticaire.

Les effets secondaires suivants apparaissent avec une fréquence inconnue: brûlures chimiques chez les nourrissons (voir rubrique «Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Merfen solution aqueuse?»).

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Les médicaments doivent être tenus hors de la portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25 °C). Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient. L'eau de Javel au contact de la chlorhexidine peut faire apparaître une coloration brunâtre sur les textiles. Les tests de lavage ont montré que les lessives contenant un ou plusieurs agents de blanchiment (par exemple, perborate) éliminent ces taches. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Merfen solution aqueuse?

1 ml de solution aqueuse contient 5 mg de digluconate de chlorhexidine et 1 mg de chlorure de benzoxonium ainsi que des excipients.

Numéro d'autorisation

51682 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Merfen solution aqueuse? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et droguerie, sans ordonnance médicale. Emballages de 3 ml, 15 ml, 50 ml et 100 ml. Spray: Emballages de 30 ml et 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juillet 2015 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

28193 / 17.10.2018