

Merfen soluzione acquosa

VERFORA SA

OOMed

Che cos'è Merfen soluzione acquosa e quando si usa?

Merfen soluzione acquosa è un disinfettante con i principi attivi di digluconato di clorexidina e di cloruro di benzoxonio. Agisce sui microorganismi responsabili di un'infezione. Merfen soluzione acquosa rimane anche attiva alla presenza di sangue e di pus. L'applicazione di Merfen soluzione acquosa è indolore. Il preparato è indicata per la disinfezione di piaghe e ferite, quali graffiature, escoriazioni, tagli, ustioni leggere (di 1° grado superficiale poco estese) e di punture d'insetti.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Le ferite di notevole estensione, molto sporche o profonde, come quelle provocate da una morsicatura o da una punta, richiedono un trattamento medico (tra l'altro rischio di tetano). Se il perimetro della ferita non diminuisce entro un certo tempo o se la ferita non cicatrizza nel giro di 10–14 giorni, consulti un medico. Lo stesso vale nel caso in cui i margini della ferita sono molto arrossati, se la ferita si gonfia improvvisamente o diventa molto dolorosa, oppure se viene accompagnata da febbre (rischio di avvelenamento del sangue).

Quando non si può usare Merfen soluzione acquosa?

L'uso di Merfen soluzione acquosa è controindicato in caso di allergia a digluconato di clorexidina, cloruro di benzoxonio o composti di ammonio quaternario oppure a una sostanza ausiliaria di questo preparato.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Merfen soluzione acquosa?

Merfen è destinato esclusivamente all'uso topico. Eviti il contatto di Merfen con gli occhi, le orecchie (condotto uditivo) e le mucose (come bocca e naso). In caso di contatto accidentale di Merfen con l'occhio, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Merfen non deve essere ingerito. Merfen non deve essere usato troppo frequentemente o per periodi prolungati senza prescrizione medica. Interrompa l'applicazione di Merfen soluzione acquosa non appena nota un'irritazione cutanea o una sensibilità anormale.

Per i bambini sotto i 2 anni, Merfen soluzione acquosa dev'essere somministrata esclusivamente su prescrizione medica. È richiesta prudenza nei neonati, in particolare nei nati prematuri. Merfen soluzione acquosa può causare ustioni chimiche della pelle. Dopo aver disinfettato, lasciar asciugare la pelle prima di applicarvi un bendaggio leggero. Per prevenire irritazioni cutanee, Merfen soluzione acquosa non si dovrebbe utilizzare sotto un bendaggio occlusivo. A causa del basso grado di assorbimento dei principi attivi digluconato di clorexidina e cloruro di benzoxonio non ci si attendono interazioni con altri medicinali. Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Consulti il suo medico se deve curare ferite estese o ustioni.

Si può usare Merfen soluzione acquosa durante la gravidanza o l'allattamento?

Gravidanza:

Il preparato può essere usato in piccola quantità (su piccole ferite) durante la gravidanza. Non sono disponibili dati adeguati sull'uso di digluconato di clorexidina e cloruro di benzoxonio in donne in gravidanza. Il rischio potenziale per gli esseri umani non è noto, ma si ritiene che sia molto basso, perché digluconato di clorexidina e cloruro di benzoxonio vengono scarsamente riassorbiti dopo applicazione topica. Si rivolga al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere se desidera usare il preparato durante la gravidanza, soprattutto nei primi tre mesi.

Allattamento:

Non è noto se digluconato di clorexidina e cloruro di benzoxonio vengano escreti nel latte materno. Durante l'allattamento, Merfen soluzione acquosa può essere usata in piccola quantità (su piccole ferite), ma non sul seno. Come misura precauzionale generale, lavi accuratamente i capezzoli con acqua prima di allattare.

Come usare Merfen soluzione acquosa?

Usi questo medicamento come descritto in basso o seguendo le istruzioni del suo farmacista/droghiere. Merfen soluzione acquosa è destinata a essere usata esclusivamente sulla pelle.

Adulti e bambini da 2 anni:

Merfen soluzione acquosa:

Applicare la soluzione 1-2 volte al giorno sulla pelle e sulle ferite, direttamente o con una compressa. Evitare che Merfen soluzione acquosa accumuli nelle pieghe della pelle. Dopo aver disinfettato, lasciar asciugare la pelle prima di applicarvi un bendaggio leggero. Non utilizzare Merfen soluzione acquosa sotto un bendaggio occlusivo. In caso di punture d'insetti: mettere alcune gocce sulla puntura, lasciare asciugare.

Merfen soluzione acquosa, spray:

Prima del primo utilizzo, azionare più volte la pompa fino alla fuoriuscita della soluzione nebulizzata. Spruzzare 1-2 volte direttamente sulla zona ferita. Dato che il flacone contiene solo soluzione acquosa (senza propellente), funziona in qualsiasi posizione, anche quando è capovolto. In questo caso occorre azionare più volte la pompa, prima che fuoriesca la soluzione nebulizzata. Evitare che Merfen soluzione acquosa si accumuli nelle pieghe della pelle. Dopo aver disinfettato, lasciar asciugare la pelle prima di applicarvi un bendaggio leggero. Non utilizzare Merfen soluzione acquosa sotto un bendaggio occlusivo. Per i bambini sotto 2 anni, Merfen soluzione acquosa dev'essere somministrata esclusivamente dietro prescrizione medica. Se ha usato più Merfen soluzione acquosa di quanto deve o se accidentalmente ha ingerito Merfen soluzione acquosa, si rivolga al suo medico. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Merfen soluzione acquosa?

Come tutti i medicinali, Merfen soluzione acquosa può avere effetti collaterali, sebbene non tutte le persone che ne fanno uso li manifestino.

Determinati effetti collaterali sono *molto rari* (si manifestano in meno di 1 paziente su 10'000), *ma possono essere gravi*: difficoltà nella respirazione, vertigini (reazione anafilattica), gonfiore del viso e della gola (angioedema). Se osserva uno dei suddetti sintomi (che possono essere segno di una reazione allergica), interrompa il trattamento con Merfen soluzione acquosa e consulti subito un medico.

I seguenti effetti collaterali sono *rari* (si manifestano in 1-10 pazienti su 10'000): irritazioni cutanee.

I seguenti effetti collaterali sono *molto rari* (si manifestano in meno di 1 paziente su 10'000): orticaria.

I seguenti effetti collaterali insorgono con frequenza sconosciuta: ustioni chimiche in neonati (si consulti la sezione intitolata «Quando è richiesta prudenza nell'uso di Merfen soluzione acquosa?») Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

I medicinali devono essere conservati fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore. La candeggina, a contatto con la clorexidina, può far apparire delle macchie brunastre sui tessuti. I test di lavaggio hanno dimostrato che i detersivi contenenti uno o più agenti sbiancanti (per esempio il perborato) eliminano queste macchie. Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Merfen soluzione acquosa?

1 ml di soluzione acquosa contiene 5 mg di digluconato di clorexidina, 1 mg di cloruro di benzoxonio e sostanze ausiliarie.

Numero dell'omologazione

51682 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Merfen soluzione acquosa? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria, senza prescrizione medica. Imballi da 3 ml, 15 ml, 50 ml e 100 ml. Spray: Imballi da 30 ml e 50 ml.

Titolare dell'omologazione

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2015 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

28193 / 17.10.2018