

Sanadermil®

VERFORA SA

Che cos'è Sanadermil e quando si usa?

L'idrocrema Sanadermil contiene come sostanza attiva acetato d'idrocortisone. Applicato sulla pelle, esercita un effetto antinfiammatorio, antiallergico e calma il prurito.

L'idrocortisone è un ormone naturale del corpo umano; combatte l'infiammazione. Applicato sulla pelle, la sua azione è locale.

Sanadermil viene usato per il trattamento di:

- leggere alterazioni eczematose della pelle,
- irritazioni cutanee e degli arrossamenti non infettati dopo contatto con detersivi, piante, cosmetici, gioielli,
- punture d'insetti non infettate,
- scottature solari,
- leggere ustioni non aperte e non infettate.

Quando non si può usare Sanadermil?

Non usi Sanadermil se è allergico al principio attivo o ad uno dei altri componenti.

Sanadermil non deve venire in contatto con gli occhi; si deve evitare di applicarlo sulle palpebre.

L'uso di Sanadermil è controindicato se soffre di un'infezione dovuta a funghi (p.es. micosi dei piedi), a virus (p.es. foruncoli da febbre, zona) o in caso di reazione cutanea in seguito ad una vaccinazione; si deve anche evitare l'applicazione su piaghe aperte o infezioni purulente (p.es. foruncoli, ascesso, acne).

Non somministrare Sanadermil a bambini di meno di 6 anni senza prescrizione e controllo medico.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Sanadermil?

Non usare Sanadermil su superfici troppo importanti, neppure sotto una fasciatura impermeabile (occlusiva).

Non si dovrebbe usare Sanadermil durante un lungo periodo. Se non nota nessun miglioramento dopo 2 settimane, si raccomanda di consultare il medico. In caso d'aggravamento dei sintomi, bisogna interrompere il trattamento e consultare il medico.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, di allergie o assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Sanadermil durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante la gravidanza dovrebbe usare Sanadermil solo con l'avviso del medico e sotto controllo medico

Durante l'allattamento non dovrebbe usare Sanadermil. Informi il medico, il farmacista o il droghiere se è incinta o se vuole allattare.

Come usare Sanadermil?

Salvo diversa prescrizione del medico:

Adulti e bambini di più di 6 anni: applicare 1-2 volte al giorno uno strato sottile sulle parti affette. Non prolungare la durata del trattamento oltre 2 settimane.

Bambini di meno di 6 anni: solo su prescrizione medica e sotto controllo medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Sanadermil?

L'uso di Sanadermil può causare i seguenti effetti collaterali:

in casi rari si possono verificare effetti indesiderati locali come una leggera sensazione di bruciore, prurito o rossori cutanei più intensi. Questi sintomi possono derivare da un'ipersensibilità agli eccipienti di Sanadermil oppure possono essere un effetto collaterale dell'idrocortisone, un principio attivo che può causare anche pelle secca.

Se un'intolleranza si dovesse manifestare, interrompa subito il trattamento. Può favorire l'insorgere di un'infezione.

In caso di uso prolungato su vaste zone e/o sotto una medicazione occlusiva, possono insorgere degli effetti indesiderati sul metabolismo.

In caso di uso a lungo termine o di applicazioni troppo frequenti, non si esclude il rischio di altri cambiamenti o d'infragilimento della pelle.

L'applicazione prolungata vicino agli occhi può causare dei disturbi oculari (aumento della pressione intraoculare, glaucoma, cataratta).

Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Conservare Sanadermil fuori dalla portata dei bambini e a temperatura ambiente (15-25 °C).

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Sanadermil?

1 g d'idrocrema contiene come principio attivo 5 mg d'acetato d'idrocortisone.

Eccipienti: antiossidante butilidrossianisolo (E 320), conservanti triclosan e clorexidina cloridrato.

Numero dell'omologazione

50135 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Sanadermil? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica. Tubetto da 15 g.

Titolare dell'omologazione

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel agosto 2018 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

21501 / 08.05.2019