

Solarcaïne® lozione

VERFORA SA

Che cos'è Solarcaïne lozione e quando si usa?

Solarcaïne lozione è un preparato analgesico ed antipruriginoso ad uso esterno, usato in caso di lesioni lievi dovute a eritemi solari, di punture d'insetti, di erosioni cutanee, di lesioni irritative della pelle e nelle ustioni di primo grado (ustioni lievi).

Solarcaïne lozione si applica facilmente, non macchia e non ingrassa.

Quando non si può usare Solarcaïne lozione?

Non si deve usare Solarcaïne lozione in caso d'ipersensibilità ad uno dei costituenti o di lesioni cutanee aperte o d'eruzioni cutanee umide.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Solarcaïne lozione?

Si deve applicare Solarcaïne lozione su lattanti e bambini di meno di 2 anni solo su prescrizione e sotto controllo del medico.

Evitare il contatto con gli occhi e le mucose della bocca.

Il trattamento deve essere sospeso alla comparsa di un'irritazione o eruzione cutanea. Non si deve usare Solarcaïne lozione su grandi superfici o durante un periodo prolungato. In caso di piaga infetta o purulenta bisogna consultare un medico. Il rischio d'assorbimento attraverso la pelle aumenta in caso d'inflammazioni cutanee (eritemi solari ad es).

Questo medicamento contiene:

- alcol cetilico e alcol stearilico, che possono provocare reazioni cutanee locali (ad esempio dermatite da contatto)
- metile paraidrossibenzoato (E 218) e propile paraidrossibenzoato (E 216), che possono provocare reazioni allergiche (eventualmente ritardate)
- geraniolo, che può provocare reazioni allergiche
- 1.02 mg di alcol benzilico per grammo di lozione Solarcaïne. L'alcol benzilico può provocare reazioni allergiche e/o una leggera irritazione locale.
- 30 mg di glicole propilenico per grammo di lozione Solarcaïne. Il glicole propilenico può causare irritazioni cutanee.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere se

- soffre di altre malattie,
- siete allergici,
- assume altri medicinali per via interna o esterna (anche se si tratta di automedicazione!).

Si può usare Solarcaïne lozione durante la gravidanza o l'allattamento?

Nessuno studio controllato è disponibile sulla donna incinta. Quindi si dovrebbe impiegare Solarcaïne lozione con prudenza durante la gravidanza. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

La lidocaina passa nel latte materno e Solarcaïne lozione non dovrebbe esser applicato durante l'allattamento.

Come usare Solarcaïne lozione?

Salvo diversa prescrizione del medico:

Adulti e bambini a partire dai 2 anni: applicare parecchie volte al giorno uno strato sottile sulle superfici da curare.

Lattanti e bambini sotto i 2 anni: applicare Solarcaïne lozione soltanto su prescrizione e sotto controllo del medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Solarcaïne lozione?

In alcune persone, la sua applicazione può causare un'irritazione locale o indurre reazioni di ipersensibilità, in particolare le allergie da contatto. In tal caso interrompere il trattamento e astenersi in futuro nell'usare questo prodotto.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Solarcaïne lozione?

1 g di Solarcaïne lozione, emulsione cutanea contiene:

Principi attivi

10 mg di lidocaina.

Sostanze ausiliarie

Paraffina liquida, sorbitano stearato, isopropil miristato, glicole propilenico, alcol stearilico, polisorbato 60, alcol cetilico, etere cetostearilico di macrogol, levomentolo, metile paraidrossibenzoato (E 218) e propile paraidrossibenzoato (E 216), simeticone, canfora racemica, alcol benzilico, benzetonio cloruro, disodio edetato, geraniolo, acqua purificata.

Numero dell'omologazione

26146 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Solarcaïne lozione? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria, senza ricetta medica.

Tubo da 85 ml.

Titolare dell'omologazione

VERFORA SA, Villars-sur-Glâne.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

