

Stilex® Gel

VERFORA SA

Was ist Stilex Gel und wann wird es angewendet?

Stilex Gel wird erfahrungsgemäss zur symptomatischen Behandlung von allergischen, juckenden und entzündlichen Hauterkrankungen z.B. bei kleinflächigen leichten Sonnenbränden, Insektenstichen, kleinflächigen allergisch bedingten Hauterkrankungen, kleineren Verbrennungen (ersten Grades) angewendet.

Wann darf Stilex Gel nicht angewendet werden?

Stilex Gel nicht anwenden:

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Wirk- oder Hilfsstoffe,
- bei akuten feuchten Hauterkrankungen sowie auf verletzter Haut oder auf infizierten Wunden.

Wann ist bei der Anwendung von Stilex Gel Vorsicht geboten?

Augen- und Schleimhautkontakt vermeiden.

Stilex Gel nicht grossflächig und über längere Zeit anwenden. Tritt nach 7 Tagen keine Besserung ein, so ist ein fachlicher Rat einzuholen.

Bei Kindern unter 2 Jahren darf Stilex Gel nur nach ärztlichem Rat angewendet werden.

Das Auftreten von einer neuartigen Hautreaktion erfordert den Abbruch der Behandlung.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf Stilex Gel während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Deshalb sollte Stilex Gel während der Schwangerschaft nicht angewendet werden, es sei denn, es ist absolut notwendig.

Lidocain tritt in die Muttermilch über, folglich sollte Stilex Gel während der Stillzeit nicht angewendet werden.

Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Stilex Gel?

Mehrmals täglich in dünner Schicht auf die betroffenen Hautpartien auftragen.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Stilex Gel haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Stilex Gel auftreten:

Bei gewissen Personen können Hautreaktionen und eine Hautsensibilisierung nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall muss die Behandlung unterbrochen werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin informieren.

Was ist ferner zu beachten?

Stilex Gel ist bei Raumtemperatur (15-25 °C) und ausserhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Stilex Gel enthalten?

1 g Gel enthält als Wirkstoffe 15 mg Mepyraminmaleat, 15 mg Lidocainhydrochlorid, 50 mg Dexpanthenol. Es enthält zudem ein Aroma, Vanillin, das antiseptische Konservierungsmittel Benzalkoniumchlorid und weitere Hilfsstoffe.

Zulassungsnummer

41312 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie Stilex Gel? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien ohne ärztliche Verschreibung. Tuben zu 20 g und 45 g.

Zulassungsinhaber

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Diese Packungsbeilage wurde im Oktober 2016 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

21509 / 25.12.2019