

# Stilex® Gel

VERFORA SA

## **OEMéd**

### **Qu'est-ce que Stilex Gel et quand doit-il être utilisé?**

Stilex gel est utilisé par expérience pour le traitement symptomatique des affections cutanées allergiques, prurigineuses ou inflammatoires; p.ex. lors de coups de soleil légers et peu étendus, de piqûres d'insectes, de dermatoses allergiques peu étendues, de brûlures mineures (du 1<sup>er</sup> degré).

### **Quand Stilex Gel ne doit-il pas être utilisé?**

Ne pas utiliser Stilex gel:

- en cas d'hypersensibilité connue à l'un des principes actifs ou des excipients,
- pour des affections cutanées humides aiguës, ainsi que sur la peau blessée ou sur des plaies infectées.

### **Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Stilex Gel?**

Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses.

Ne pas utiliser Stilex gel sur des grandes surfaces ou pendant une période prolongée. Sans amélioration après 7 jours, demander un avis spécialisé.

Ne pas utiliser Stilex gel pour les enfants de moins de 2 ans sans avis médical.

L'apparition de nouvelles réactions cutanées impose l'arrêt du traitement.

Veillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

### **Stilex Gel peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?**

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. C'est pourquoi Stilex gel ne devrait pas être utilisé pendant la grossesse, sauf en cas de nécessité absolue.

La lidocaïne passe dans le lait maternel et Stilex gel ne devrait donc pas être appliqué pendant la période d'allaitement.

Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

### **Comment utiliser Stilex Gel?**

Appliquer plusieurs fois par jour en couche mince sur les surfaces à traiter.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

### **Quels effets secondaires Stilex Gel peut-il provoquer?**

L'utilisation de Stilex gel peut provoquer les effets secondaires suivants:

Chez certaines personnes, des réactions cutanées et une sensibilisation de la peau ne peuvent pas être exclues. Dans ce cas, il faudrait cesser le traitement.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

### **A quoi faut-il encore faire attention?**

Conserver Stilex gel à température ambiante (15-25 °C) et hors de la portée des enfants.

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

### **Que contient Stilex Gel?**

1 g de gel contient comme principes actifs 15 mg de maléate de mépyramine, 15 mg de chlorhydrate de lidocaïne et 50 mg de dexpanthénol. Il contient également un arôme, de la vanilline, le conservateur antiseptique chlorure de benzalkonium et d'autres excipients.

### **Numéro d'autorisation**

41312 (Swissmedic).

### **Où obtenez-vous Stilex gel? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?**

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale. Tubes de 20 g et 45 g.

### **Titulaire de l'autorisation**

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

**Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2016 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).**

21509 / 26.09.2018