

Stilex® Gel

VERFORA SA

Che cos'è Stilex Gel e quando si usa?

Stilex Gel è usato come dimostra l'esperienza nel trattamento sintomatico di affezioni cutanee allergiche, pruriginose o infiammatorie, come p.es. negli eritemi solari di piccola superficie, nelle punture d'insetti, affezioni cutanee poco estese di tipo allergico, ustioni lievi (del 1° grado).

Quando non si può usare Stilex Gel?

Non usare Stilex Gel:

- in caso d'ipersensibilità conosciuta ad uno dei principi attivi o eccipienti,
- per affezioni cutanee umide acute, come pure sulla pelle ferita o su piaghe infettate.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Stilex Gel?

Evitare il contatto con gli occhi e le mucose.

Non usare Stilex Gel su grandi superfici o durante un periodo prolungato. Senza miglioramento dopo 7 giorni, chiedere un consiglio specializzato.

Non usare Stilex Gel per i bambini di meno di 2 anni senza consiglio del medico.

Sospendere il trattamento in caso di comparsa di nuove reazioni cutanee.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, di allergie o assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Stilex Gel durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora state compiute indagini scientifiche sistematiche. Quindi non si dovrebbe impiegare Stilex Gel durante la gravidanza, a meno che non sia chiaramente necessario.

La lidocaina passa nel latte materno e Stilex Gel non dovrebbe esser applicato durante l'allattamento.

Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Stilex Gel?

Applicare parecchie volte al giorno in strato sottile sulle superfici da curare.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Stilex Gel?

Con l'assunzione o l'applicazione di Stilex Gel possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

da certe persone non si può escludere la comparsa di reazioni cutanee e di sensibilizzazioni della pelle. In questo caso bisognerebbe interrompere il trattamento.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Conservare Stilex Gel a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini. Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Stilex Gel?

1 g di Gel contiene come principi attivi 15 mg di maleato di mepiramina, 15 mg di cloridrato di lidocaina e 50 mg di dexpantenolo. Contiene pure un aroma, vanillina, il conservante antisettico cloruro di benzalkonio e altri eccipienti.

Numero dell'omologazione

41312 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Stilex gel? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria, senza ricetta medica. Tubi da 20 g e 45 g.

Titolare dell'omologazione

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel ottobre 2016 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

21509 / 25.12.2019