

Triofan® Allergie

VERFORA SA

Qu'est-ce que Triofan Allergie et quand doit-il être utilisé?

Les comprimés à sucer Triofan Allergie sont efficaces dans le traitement de fond des maladies allergiques. Ils bloquent l'action de l'histamine qui est libérée dans le corps par les réactions allergiques.

Triofan Allergie est employé chez les adultes et les enfants à partir de 6 ans pour le traitement des maladies allergiques, comme le rhume des foins, la rhinite allergique et la conjonctivite allergique, ainsi que l'urticaire chronique (souvent accompagnée de démangeaisons).

La durée du traitement pour des enfants atteints de rhinite allergique ne doit pas dépasser 4 semaines.

Quand Triofan Allergie ne doit-il pas être utilisé?

Les patients ou patientes qui sont hypersensibles au principe actif, à d'autres substances apparentées ou à un autre composant de Triofan Allergie ne doivent pas utiliser cette préparation.

Les patientes qui allaitent ne devraient pas utiliser Triofan Allergie. Pendant la grossesse, Triofan Allergie ne devrait être administré que sur prescription médicale.

Les patients ou les patientes atteints d'une maladie rénale grave (insuffisance rénale grave avec une clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min) ne doivent pas utiliser Triofan Allergie.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Triofan Allergie?

Les enfants de moins de 6 ans ne devraient pas être traités avec Triofan Allergie.

La prise simultanée de Triofan Allergie et de théophylline (un principe actif destiné au traitement des détresses respiratoires) ne devrait intervenir qu'après discussion avec votre médecin.

Triofan Allergie et les préparations contenant du glipizide (un médicament destiné au traitement du diabète) ne devraient pas être pris ensemble. Il est recommandé de prendre la médication contenant le glipizide le matin et Triofan Allergie le soir.

Chez les épileptiques, Triofan Allergie devrait être utilisé avec prudence, car il peut déclencher des crises de convulsions.

La prudence s'impose en cas d'utilisation simultanée de Triofan Allergie avec des sédatifs ou des antalgiques.

Il est préconisé de renoncer à toute consommation d'alcool pendant le traitement avec Triofan Allergie.

La prise de Triofan Allergie pouvant entraîner un risque de somnolence, la prudence s'impose chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines.

Si vous devez passer un test d'allergie, demandez à votre médecin si vous devez suspendre la prise de Triofan Allergie pendant quelques jours avant le test, car ce médicament pourrait influencer le résultat du test d'allergie.

Chez les patients prédisposés à la rétention urinaire (incapacité à vider la vessie spontanément), par exemple en cas de lésion de la moelle épinière ou d'une augmentation du volume prostatique, Triofan Allergie peut augmenter le risque de rétention urinaire.

Veillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'autres maladies, si vous êtes allergique ou si vous prenez d'autres médicaments (même en automédication).

Triofan Allergie peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Aucun effet secondaire indésirable n'a été constaté lors des études portant sur des animaux. Toutefois, Triofan Allergie (comme d'autres médicaments) ne devrait pas être pris pendant la grossesse. Si vous avez pris Triofan Allergie par inadvertance pendant votre grossesse, un effet nocif pour l'enfant à naître n'est pas à craindre; cependant le traitement devrait être interrompu immédiatement. Demandez conseil à votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous souhaitez l'être.

Triofan Allergie ne doit pas être pris pendant la période d'allaitement car le principe actif passe dans le lait maternel.

Comment utiliser Triofan Allergie?

Pour les adultes et les enfants dès 6 ans, le dosage habituel est d'un comprimé à sucer une fois par jour.

Pour les enfants de 6 à 12 ans, ce dosage peut être réparti en deux prises: un demi-comprimé à sucer matin et soir.

En cas d'apparition d'effets secondaires légers (fatigue, maux de tête, troubles gastro-intestinaux) ne disparaissant pas d'eux-mêmes, il est également recommandé aux adultes de prendre un demi-comprimé à sucer matin et soir.

La prise de Triofan Allergie peut intervenir au moment des repas ou en dehors des repas.

La durée du traitement dépend du type, de la durée et de l'évolution des symptômes; elle est fixée par le médecin.

Patients atteints d'insuffisance rénale modérée à grave:

Les patients ou patientes atteints d'insuffisance rénale recevront le cas échéant une dose réduite en fonction du degré de gravité de l'affection rénale. Cette dose est fixée par le médecin traitant.

En cas d'oubli d'une prise de Trioфан Allergie, continuez simplement votre traitement. Ne prenez pas de double dose pour compenser votre oubli.

En cas de surdosage, adressez-vous immédiatement à votre médecin.

Veillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou trop forte, adressez-vous à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Trioфан Allergie peut-il provoquer?

La prise de Trioфан Allergie peut provoquer les effets secondaires suivants: au début du traitement, une légère fatigue peut apparaître. Des cas de maux de tête légers, troubles de la concentration, somnolence, vertige, sécheresse de la bouche, troubles gastro-intestinaux (p.ex. diarrhée, douleurs abdominales), nausée et réactions d'hypersensibilité ont été rapportés.

De rares cas de crises de convulsions, de troubles de la motricité, de réactions de photosensibilité, de lésions hépatiques, de choc allergique, d'arrêt circulatoire, de surdit , de malaise, de  mangeaison, d' ruptions cutan es, d'urticaire, de troubles de la sensibilit  cutan e, d'acc l ration du rythme cardiaque et d'agitation, d' d mes (gonflements), de prise de poids, de confusion, d'hallucinations, d'insomnie, d'agressivit , de troubles de la miction (excr tion urinaire anormale), de fatigue extr me, d'inflammations veineuses (phl bites) et de troubles de la vue ont  t  observ s.

On peut  galement observer des pertes de m moire (amn sie), des troubles de la m moire, des vertiges, de la r tention urinaire, une augmentation de l'app tit et des pens es suicidaires dont la fr quence ne peut pas  tre  valu e   partir des donn es disponibles.

En cas d'apparition d'un de ces effets secondaires, cessez la prise de Trioфан Allergie et informez-en votre m decin. Si vous observez des effets secondaires qui ne sont pas mentionn s ci-dessus, informez-en votre m decin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Conservez ce m dicament hors de port e des enfants,   temp rature ambiante (15–25  C) et   l'abri de la lumi re.

Le m dicament ne doit  tre utilis  que jusqu'  la date indiqu e apr s la mention «EXP» sur le r cipient.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre m decin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information d taill e destin e aux professionnels.

Que contient Trioфан Allergie?

1 comprim    sucer contient comme principe actif 10 mg de dichlorhydrate de c tirizine; il contient  galement l' dulcorant cyclamate, un ar me et d'autres excipients.

Num ro d'autorisation

57067 (Swissmedic).

O  obtenez-vous Trioфан Allergie? Quels sont les emballages   disposition sur le march ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance m dicale. Emballages de 7 comprim s   sucer.

Titulaire de l'autorisation

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Gl ne.

Cette notice d'emballage a  t  v rifi e pour la derni re fois en novembre 2012 par l'autorit  de contr le des m dicaments (Swissmedic).

21521 / 04.06.2019