

## Triofan® Rhinite retard, capsules

VERFORA SA

### **Qu'est-ce que Triofan Rhinite retard et quand doit-il être utilisé?**

Les capsules Triofan Rhinite retard contiennent:

- un antihistaminique bien toléré, le maléate de chlorphénamine, qui soulage rapidement des symptômes pénibles de l'inflammation nasale (rhinite) tels qu'écoulement de mucus (rhinorrhée), éternuements, sensation de picotement, larmolement;
- un vasoconstricteur, le chlorhydrate de phényléphrine, décongestionnant efficace de la muqueuse nasale enflammée. Il permet le drainage des voies respiratoires et facilite ainsi la respiration.

L'action prolongée de Triofan Rhinite retard pendant 10 à 12 heures est due à la dialyse des principes actifs (Diffucap®) contenus dans les centaines de microgranules d'une capsule. Ainsi, une capsule le matin au lever soulage de manière continue et régulière toute la journée, une seconde capsule au coucher permet un repos nocturne non troublé et un réveil sans congestion nasale.

Triofan Rhinite retard est utilisé lors d'affections inflammatoires et allergiques des voies respiratoires supérieures telles que rhume, rhume des foins, rhinorrhées chroniques, rhinite vasomotrice, rhinite allergique, ainsi que comme adjuvant en cas de grippe et de refroidissement.

### **Quand Triofan Rhinite retard ne doit-il pas être utilisé?**

Triofan Rhinite retard ne doit pas être associé aux inhibiteurs de la monoamine oxydase (MAO). En cas de maladies coronariennes graves, d'hypersensibilité à l'un des composants et d'hypertension artérielle sévère, Triofan Rhinite retard ne doit être pris que sur avis médical.

Il ne doit pas être donné aux enfants de moins de 12 ans.

### **Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/utilisation de Triofan Rhinite retard?**

La prudence est recommandée en cas de: glaucome par fermeture de l'angle, diabète sucré, hypertrophie de la prostate, hyperthyroïdie, asthme bronchique. Triofan Rhinite retard ne devrait pas être utilisé de manière trop fréquente pendant une période prolongée. Si les symptômes persistent anormalement ou récidivent continuellement, il convient de consulter un médecin.

Bien que l'antihistaminique n'ait qu'un faible pouvoir sédatif, d'autant plus qu'il est administré sous une forme retard, Triofan Rhinite retard peut diminuer les capacités de réactions: la prudence est recommandée chez les automobilistes et les manipulateurs de machines.

Veillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez déjà d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez ou utilisez (en usage externe) déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

### **Triofan Rhinite retard peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?**

Aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée avec Triofan Rhinite retard. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Au dernier trimestre de la grossesse et en période d'allaitement, ce médicament comporte le risque d'effets indésirables grave.

### **Comment utiliser Triofan Rhinite retard?**

Sauf autre prescription du médecin:

#### **Adultes et enfants dès 12 ans:**

Dès l'apparition des symptômes, prendre 1 capsule toutes les 12 heures, soit 1 capsule le matin et une seconde le soir.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

### **Quels effets secondaires Triofan Rhinite retard peut-il provoquer?**

La prise de Triofan Rhinite retard peut provoquer les effets secondaires suivants: une somnolence passagère ou une diminution de l'attention, une vision trouble, des effets gastro-intestinaux ou une sécheresse de la bouche, exceptionnellement une éruption cutanée.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

### **A quoi faut-il encore faire attention?**

Conserver Triofan Rhinite retard hors de la portée des enfants, dans un endroit sec, à température ambiante (15–25 °C) et à l'abri de la lumière. Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

### **Que contient Triofan Rhinite retard?**

1 capsule contient comme principes actifs 4 mg de maléate de chlorphénamine et 20 mg de chlorhydrate de phényléphrine, ainsi que comme excipients 253 mg de saccharose (sucre) et les colorants E 127 (érythrosine) et E 132 (indigotine).

### **Numéro d'autorisation**

33445 (Swissmedic).

### **Où obtenez-vous Triofan Rhinite retard? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?**

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Boîtes de 10 capsules.

### **Titulaire de l'autorisation**

VERFORA SA, Villars-sur-Glâne.

**Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2016 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).**

21527 / 04.06.2019