

Triofan® Rhinitis retard, Kapseln

VERFORA SA

Was ist Triofan Rhinitis retard und wann wird es angewendet?

Triofan Rhinitis retard Kapseln enthalten:

- ein gut verträgliches Antihistaminikum, Chlorphenaminmaleat. Es bringt rasche Linderung der lästigen Erscheinungen der Nasenentzündung (Schnupfen) wie Nasenrinnen, Niesen, Kribbeln und Tränenfluss;
- einen Vasokonstriktor, Phenylephrinhydrochlorid, der abschwellend auf die entzündete Nasenschleimhaut wirkt, die verstopften Nasengänge befreit und dadurch die Atmung erleichtert.

Die 10–12 Stunden anhaltende Langzeitwirkung von Triofan Rhinitis retard beruht auf der Dialyse der Wirkstoffe (Diffucap®), welche in den Hunderten von Mikrogranula jeder Kapsel enthalten sind. Somit verschafft eine Kapsel Triofan Rhinitis retard, morgens beim Aufstehen eingenommen, eine während des ganzen Tages gleichmässig anhaltende Erleichterung; eine zweite vor dem Schlafengehen gewährleistet eine ungestörte Nachtruhe und am nächsten Morgen ein Aufwachen ohne Verstopfung der Nase.

Triofan Rhinitis retard wird bei entzündlichen und allergischen Erkrankungen der oberen Atemwege wie Schnupfen, Heuschnupfen, chronischem Nasenrinnen, vasomotorischer bzw. allergischer Rhinitis, angewendet sowie als Adjuvans bei Grippe und Erkältungen.

Wann darf Triofan Rhinitis retard nicht angewendet werden?

Triofan Rhinitis retard darf nicht mit Hemmern der Monoaminoxidase (MAO-Hemmstoffe) zusammen eingenommen werden. Bei schwerer Krankheit der Koronargefässe, Überempfindlichkeit auf einen der Inhaltsstoffe sowie bei stark erhöhtem Blutdruck darf Triofan Rhinitis retard nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt bzw. mit Ihrer Ärztin angewendet werden.

Darf bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wann ist bei der Einnahme/Anwendung von Triofan Rhinitis retard Vorsicht geboten?

Vorsicht ist geboten bei: Engwinkelglaukom, Zuckerkrankheit, Prostata-Hypertrophie, Überfunktion der Schilddrüse, Bronchialasthma (Anfälle von Atemnot mit erschwelter Ausatmung). Triofan Rhinitis retard sollte nicht zu häufig und über längere Zeit angewendet werden. Wenn die Symptome länger als normal bestehen oder immer wiederkehren, sollten Sie den Arzt bzw. die Ärztin aufsuchen.

Wenn auch die sedierende Wirkung des Antihistaminikums nur gering ist, dies umso mehr als es in Retard-Form angewandt wird, ist beim Autofahren und Bedienen von Maschinen Vorsicht geboten.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten, bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden.

Darf Triofan Rhinitis retard während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen/angewendet werden?

Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden mit Triofan Rhinitis retard nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Im letzten Schwangerschaftstrimester und während der Stillzeit birgt dieses Arzneimittel das Risiko schwerer unerwünschter Wirkungen.

Wie verwenden Sie Triofan Rhinitis retard?

Falls nicht anders vom Arzt bzw. von der Ärztin verordnet:

Erwachsene und Kinder über 12 Jahre:

Beim Auftreten der Symptome 1 Kapsel alle 12 Stunden, d.h. 1 Kapsel morgens und 1 Kapsel abends, einnehmen.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Triofan Rhinitis retard haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Triofan Rhinitis retard auftreten: eine vorübergehende Schläfrigkeit oder eine Verminderung der Aufmerksamkeit, verschwommenes Sehen, gastrointestinale Wirkungen oder Mundtrockenheit, ausnahmsweise Hautausschlag.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin informieren.

Was ist ferner zu beachten?

Triofan Rhinitis retard für Kinder unerreichbar, trocken, bei Raumtemperatur (15–25 °C) und vor Licht geschützt, aufbewahren.

Die Kapseln dürfen nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Triofan Rhinitis retard enthalten?

1 Kapsel enthält als Wirkstoffe 4 mg Chlorphenaminmaleat, 20 mg Phenylephrinhydrochlorid, sowie als Hilfsstoffe 253 mg Saccharose (Zucker) und die Farbstoffe E 127 (Erythrosin) und E 132 (Indigotin).

Zulassungsnummer

33445 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie Triofan Rhinitis retard? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung. Packung zu 10 Kapseln.

ZulassungsinhaberIn

VERFORA SA, Villars-sur-Glâne.

Diese Packungsbeilage wurde im Dezember 2016 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

21527 / 04.06.2019