

Adler Calmin comprimés

Adler Pharma Helvetia AG

OEMéd

Quand Adler Calmin est-il utilisé?

Adler Calmin est un remède homéopathique élaboré conformément au concept thérapeutique de la biochimie selon le Dr. Schüssler Conformément au concept thérapeutique de la biochimie selon le Dr. Schüssler, Adler Calmin peut être utilisé en cas de troubles légers du sommeil tels que des difficultés d'endormissement ou des réveils nocturnes et en cas d'états d'agitation légère.

L'utilisation de ce remède homéopathique dans les domaines d'application cités est fondée exclusivement sur les expériences de la biochimie selon le Dr Schüssler.

En cas de formes graves de ces affections, un traitement cliniquement prouvé devrait être suivi sur la base d'un diagnostic médical.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si après 7 jours, vous constatez que vous ne vous sentez pas mieux, voire que vos problèmes s'aggravent, veuillez consulter votre médecin.

1 comprimé contient 250 mg de lactose. Si votre médecin a constaté que vous présentez une intolérance au sucre, informez-le avant de prendre ce médicament.

Remarque pour les diabétiques: 1 comprimé contient 0,25 g de glucides assimilables.

Ce médicament ne permet pas de traiter les carences en vitamines et minéraux (p.ex. en calcium, magnésium, zinc).

Quand Adler Calmin ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans. En cas d'utilisation conforme, il n'est pas nécessaire de prendre de précautions particulières.

Si vous

- souffrez d'autres maladies
 - d'allergies ou
 - si vous prenez d'autres médicaments (également si achetés de votre propre chef),
- veuillez en informer en votre médecin, votre pharmacien ou votre parapharmacien.

Adler Calmin peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites jusqu'à ce jour, il n'y a pas de risque pour l'enfant en cas d'utilisation conforme. Il n'a jamais été procédé à des études scientifiques systématiques. Par mesure de précaution, il est préférable que vous ne preniez si possible aucun médicament pendant la grossesse et l'allaitement ou que vous demandiez conseil au médecin, au pharmacien ou au parapharmacien, respectivement à la pharmacienne ou à la parapharmacienne.

Comment utiliser Adler Calmin?

Sauf prescription différente du médecin:

En cas d'états d'agitation:

En cas de troubles aigüs, 1 comprimé toutes les 5-10 minutes

Dans tous les autres cas, 1 comprimé toutes les 30 minutes

En cas de problèmes d'endormissement et de réveils nocturnes.

En cas de troubles aigüs, 1 comprimé toutes les 5-10 minutes 3 heures avant le coucher

Dans tous les autres cas, 1 comprimé toutes les 30 minutes

Ne pas prendre plus de 80 comprimés par jour

En cas d'amélioration des troubles, il convient de réduire la fréquence d'utilisation.

Laisser fondre Adler Calmin *en comprimés* dans la bouche.

Chez les enfants, le comprimé peut être réduit en bouillie en mélangeant avec quelques gouttes d'eau.

Les comprimés d'Adler Calmin peuvent être pris juste avant les repas et à partir de 15 minutes après les repas.

Respectez la posologie indiquée dans la notice d'accompagnement ou prescrite par le médecin. Si lors du traitement d'un nourrisson/d'un enfant, l'amélioration escomptée ne se produit pas, il convient de l'emmener chez le médecin. Si vous pensez que le médicament a un effet trop faible ou trop fort, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien(ne) ou votre parapharmacien(ne).

Quels effets secondaires Adler Calmin peut-il provoquer?

Chez les personnes souffrant d'intolérance au lactose, la prise de ce médicament peut entraîner des troubles gastro-intestinaux ou avoir un effet laxatif. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas décrits ici, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien(ne) ou votre parapharmacien(ne).

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «utilisable jusqu'à» sur le récipient.

À conserver dans l'emballage d'origine.

Conserver le médicament hors de portée des enfants et à température ambiante (15-25 °C).

Votre médecin, votre pharmacien ou votre parapharmacie pourront vous fournir d'autres renseignements utiles.

Le lactose absorbe facilement les odeurs de l'environnement, c'est pourquoi les comprimés doivent toujours être conservés dans la boîte fermée et dans des locaux sans odeurs

Que contient Adler Calmin?

1 comprimé à 260 mg contient: Calcium phosphoricum D6 55 mg, Magnesium phosphoricum D6 55 mg, Cuprum arsenicosum D12 30 mg, Calcium sulfuricum D6 50 mg, Zincum chloratum D12 30 mg, Natrium tetrachloroauratum D12 30mg.

Cette préparation contient en outre des excipients:

Lactose, fécule de pomme de terre et bécénate de calcium

Numéro d'autorisation

65111 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Adler Calmin? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

Dans les pharmacies et les parapharmacies, sans prescription médicale.

Boîtes de 400 et 1000 comprimés

Titulaire de l'autorisation

Adler Pharma Helvetia AG

Dorfplatz 10

CH-6060 Sarnen

Suisse

Fabricant:

Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH

Brucker Bundesstrasse 25A

A-5700 Zell am See

Autriche

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2017 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

28246 / 08.12.2017