

Adler Juvebene

Adler Pharma Helvetia AG

Qu'est-ce que le Adler Juvebene et quand est-il utilisé?

D'après le principe thérapeutique du Dr. Schüssler qui s'appuie sur la biochimie, Adler Juvebene peut être utilisé en cas de douleurs articulaires ou osseuses survenant pendant la phase de croissance chez les enfants et les adolescents.

L'utilisation de ce médicament pour l'indication mentionnée se réfère uniquement aux principes de la Biochimie d'après le Dr. Schüssler.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste si Adler Juvebene peut être pris en même temps.

Remarque à l'intention des diabétiques: 1 comprimé contient 0,25 g de glucides par dose individuelle.

Ce médicament ne convient pas au traitement d'états de carence en micronutriments (par ex. zinc).

Quand Adler Juvebene ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Adler Juvebene ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 1 an. Toute utilisation chez des enfants de moins de 3 ans nécessite impérativement un avis médical. Si les troubles s'aggravent ou si aucune amélioration n'est constatée après 7 jours, consultez un médecin.

Ce médicament contient 0,25 g de lactose (0,125 g glucose et 0,125 g de galactose) par comprimé. Il convient d'en tenir compte pour les patients présentant un diabète sucré.

Si votre médecin a diagnostiqué chez vous une intolérance au sucre, veuillez l'informer avant de prendre Adler Juvebene.

Aucune restriction d'utilisation n'est connue à ce jour. Aucune mesure de précaution spécifique n'est nécessaire en cas d'utilisation conforme.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!)

Adler Juvebene peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Adler Juvebene?

Sauf prescription contraire de votre médecin:

Enfants à partir de 3 ans et adolescents jusqu'à 18 ans:

En cas de troubles aigus, 1 comprimé toutes les 5-10 minutes

Dans les autres cas, 1 comprimé toutes les 30 minutes

Ne pas prendre plus de 80 comprimés par jour

Ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 1 an. Toute utilisation chez des enfants de moins de 3 ans nécessite impérativement un avis médical.

En cas d'amélioration des troubles, réduire la fréquence des prises.

Laisser fondre Adler Juvebene dans la bouche.

Adler Juvebene peut être pris immédiatement avant le repas et à partir de 15 minutes après.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée du très jeune enfant ou de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Adler Juvebene peut-il provoquer?

Ce médicament peut déclencher chez les personnes souffrant d'intolérance au lactose des troubles gastro-intestinaux ou des diarrhées. Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Cela s'applique plus particulièrement aux effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice.

Jusqu'à présent, aucun effet secondaire n'a été constaté en cas d'utilisation conforme d'Adler Juvebene. Toutefois, si vous constatez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant sur le récipient.

Lagerungshinweis

Conserver le médicament dans son emballage d'origine à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Autres instructions

Vous pourrez obtenir de plus amples informations auprès de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Que contient Adler Juvebene?

1 comprimé de 260 mg contient:

Principes actifs

N°2 Calcium phosphoricum (HAB) D6 (HAB 6) 50 mg, N°4 Kalium chloratum (HAB) D6 (HAB 6) 50 mg, N°5 Kalium phosphoricum (HAB) D6 (HAB 6) 50 mg, N°13 Kalium arsenicosum D12 (HAB 6) 26 mg, N°21 Zincum chloratum (Zinci chloridum Ph.Eur) D12 (HAB 6) 37 mg, N°22 Calcium carbonicum (Ph.Eur.) D12 (HAB 6) 37 mg.

Excipients

Lactose (250 mg), fécule de pomme de terre et biphénate de calcium

Numéro d'autorisation

68745

Où obtenez-vous Adler Juvebene? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 400 et 1000 comprimés.

Titulaire de l'autorisation

Adler Pharma Helvetia AG

Dorfplatz 10

CH-6060 *Sarnen*

Suisse

Fabricant

Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH

Brucker Bundesstrasse 25A

A-5700 Zell am See

Autriche

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en septembre 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

31037 / 13.06.2023